

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата
«Тиксфли®»

1. Торговое наименование.

Существуют следующие разновидности препарата:

Тиксфли 112,5 мг таблетки для собак очень мелких пород 2-4,5 кг и для кошек мелких пород 1,8 – 3,1 кг.

Тиксфли 250 мг таблетки для собак мелких пород 4,5-10 кг и для кошек крупных пород 3,2 – 6,5 кг.

Тиксфли 500 мг таблетки для собак средних пород 10-20 кг.

Тиксфли 1000 мг таблетки для собак крупных пород 20-40 кг.

Тиксфли 1400 мг таблетки для собак очень крупных пород 40-56 кг.

2. Международное непатентованное наименование.

Карбамоил бензамид фенил изоксазолин (*Carbamoyl benzamide phenyl isoxazoline*).

3. Регистрационный номер.

Тиксфли 112,5 мг таблетки для собак очень мелких пород 2-4,5 кг и для кошек мелких пород 1,8 – 3,1 кг - 8932-10-24 ЗСПА

Тиксфли 250 мг таблетки для собак мелких пород 4,5-10 кг и для кошек крупных пород 3,2 – 6,5 кг - 8933-10-24 ЗСПА

Тиксфли 500 мг таблетки для собак средних пород 10-20 кг - 8934-10-24 ЗСПА

Тиксфли 1000 мг таблетки для собак крупных пород 20-40 кг - 8935-10-24 ЗСПА

Тиксфли 1400 мг таблетки для собак очень крупных пород 40-56 кг - 8936-10-24 ЗСПА

4. Лекарственная форма.

Таблетки для приема внутрь.

Описание.

Таблетки для собак - плоскоцилиндрической формы от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, допускается наличие вкраплений, с риской на одной стороне и цифрами содержания активнодействующего вещества на другой.

Таблетки для кошек – продолговатой формы, двояковыпуклые от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с риской на двух сторонах, допускается наличие более темных и более светлых вкраплений.

5. Состав.

Тиксфли 112,5 мг таблетки для собак очень мелких пород 2-4,5 кг и для кошек мелких пород 1,8 – 3,1 кг. Каждая таблетка содержит в качестве действующего вещества 112,5 мг карбамоил бензамид фенил изоксазолина, а также вспомогательные вещества.

Тиксфли 250 мг таблетки для собак мелких пород 4,5-10 кг и для кошек крупных пород 3,2 – 6,5 кг. Каждая таблетка содержит в качестве действующего вещества 250 мг карбамоил бензамид фенил изоксазолина, а также вспомогательные вещества.

Тиксфли 500 мг таблетки для собак средних пород 10-20 кг. Каждая таблетка массой 2,5 г содержит в качестве действующего вещества 500 мг карбамоил бензамид фенил изоксазолина, а также вспомогательные вещества.

Тиксфли 1000 мг таблетки для собак крупных пород 20-40 кг. Каждая таблетка массой 4,0 г содержит в качестве действующего вещества 1000 мг карбамоил бензамид фенил изоксазолина, а также вспомогательные вещества.

Тиксфли 1400 мг таблетки для собак очень крупных пород 40-56 кг. Каждая таблетка массой 4,0 г содержит в качестве действующего вещества 1400 мг карбамоил бензамид фенил изоксазолина, а также вспомогательные вещества.

Вспомогательные вещества: порошок из куриной печени, гидрофосфат кальция, магния стеарат, масло семян подсолнечника, масло семян льна, повидон К30, D,L-метионин, сухое молоко, сахароза.

6. Фармакотерапевтическая группа.
Инсектоакарицидные средства.

7. Фармакодинамика и механизм действия.

Препарат эффективен против иксодовых клещей (*Ixodes spp.*, *Dermacentor spp.*, *Rhipicephalus sanguineus*), тромбидиформных клещей (*Demodex canis*, *Cheyletiella yasguri*), саркоптоидных клещей (*Sarcoptes canis*, *Otodectes cynotis*), вшей (*Linognathus setosus*), власоедов (*Trichodectes canis*) и блох (*Ctenocephalides spp.*), паразитирующих на собаках и кошках. Он проявляет высокую системную активность после прикрепления эктопаразитов к телу животного и начала питания.

Карбамоил бензамид фенил изоксазолин, входящий в состав препарата является инсектоакарицидом системного действия группы изоксазолинов, ингибитором компонентов нервной системы членистоногих, который нарушает передачу нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели эктопаразитов. В основе его эффекта лежит антагонизм в отношении лиганд-управляемых каналов хлорид-ионов, включая ГАМК и глутамат-рецепторы.

После перорального применения препарата карбамоил бензамид фенил изоксазолин хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте (биодоступность более 85%), быстро адсорбируется, поступает в системный кровоток и связывается с белками плазмы крови, максимальная концентрация в плазме крови отмечается в течение 12-24 часов. Он эффективно распределяется в органах и тканях, при этом наиболее высокая концентрация препарата достигается в жировой ткани, затем в печени, почках и мышцах. Длительное действие, медленная элиминация из плазмы крови (период полувыведения до 15 дней) и замедленное высвобождение обеспечивают эффективные концентрации карбамоил бензамид фенил изоксазолина в течение продолжительного периода. Максимальная концентрация в плазме крови и период полувыведения у разных животных может отличаться. Карбамоил бензамид фенил изоксазолин не подвергается значимому метаболизму и выводится, главным образом, с фекалиями и частично с мочой.

Прием препарата вместе с кормом ускоряет всасывание. Препарат вызывает гибель блох, паразитирующих на собаках и кошках, через 8 часов, клещей – через 12 часов, предотвращая повторную инфеestацию животных эктопаразитами.

Гибель вновь появившихся на животных блох до откладки насекомыми жизнеспособных яиц вызывают очень низкие концентрации карбамоил бензамид фенил изоксазолина, что предотвращает контаминацию помещений яйцами и личинками.

Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

8. Показания для применения.

Препарат назначают собакам и кошкам в целях:

- профилактики и лечения при акарозах, вызываемых иксодовыми клещами, саркоптоидными клещами, тромбидиформными клещами;
- профилактики и лечения энтомозов, вызываемых вшами, власоедами, блохами, а также комплексной терапии аллергического дерматита, вызываемого блохами;
- предотвращения заражения дипилидиозом, передаваемым блохами, инвазированными личинками гельминта.

9. Противопоказания.

При соблюдении инструкции по применению особенностей действия препарата на собак и кошек при его применении и при отмене не выявлено.

10. Способ применения и дозы.

Препарат назначают собакам в любое время года индивидуально перорально во время или незадолго до/или после кормления в терапевтической дозе 25-56 мг карбамоил бензамид фенил изоксазолина на 1 кг массы животного.

Инсектоакарицидное действие препарата продолжается в течение 90 дней (3 месяца).

Препарат обладает привлекательным ароматом и вкусом и, как правило, охотно поедается собаками; в противном случае, его вводят принудительно непосредственно в пасть или скармливают с кормом. Следует убедиться в том, что собака полностью проглотила необходимую дозу препарата.

Не допускается разламывать и делить таблетки для подбора дозы.

При применении препарата собакам массой более 56 кг используют комбинацию таблеток из расчета 25-56 мг карбамоил бензамид фенил изоксазолина на 1 кг массы тела животного.

Повторные обработки при необходимости проводят через 90 дней (3 месяца).

При групповом содержании лечение всех животных рекомендуется проводить одновременно. Дозы препарата и количество таблеток в зависимости от массы животного представлены в таблице:

Масса собаки (кг)	Количество таблеток «Тиксфли» и доза действующего вещества в таблетке (мг)				
2,0-4,5	1 (112,5)				
4,5-10		1 (250)			
10-20			1 (500)		
20-40				1 (1000)	
40-56					1(1400)
более 56	подбирают комбинацию двух таблеток из расчета 25-56 мг карбамоил бензамид фенил изоксазолина на 1 кг массы животного				

Препарат назначают кошкам индивидуально перорально во время или незадолго до/или после кормления в терапевтической дозе 30-80 мг карбамоил бензамид фенил изоксазолина на 1 кг массы тела животного.

Инсектоакарицидное действие препарата продолжается в течение 80 дней.

Препарат обладает привлекательным ароматом и вкусом и, как правило, охотно поедается кошками; в противном случае, его вводят принудительно непосредственно в пасть на корень языка или скармливают с кормом. Следует убедиться в том, что кошка полностью проглотила необходимую дозу препарата.

Не допускается разламывать и делить таблетки для подбора дозы. Для животных большего веса, делают расчет, согласно указанной терапевтической дозы на кг массы тела животного.

Повторные обработки при необходимости проводят через 80 дней.

При групповом содержании лечение всех животных рекомендуется проводить одновременно.

Дозы препарата и количество таблеток в зависимости от массы животного представлены в таблице:

Масса кошки (кг)	Количество таблеток «Тиксфли» и доза действующего вещества в таблетке (мг)
1,8-3,1	1 (112,5)
3,2-6,5	1 (250)

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

12. Передозировка.

При передозировке препарата возможно проявление нежелательных реакций: диарея, рвота, снижение аппетита и слюнотечение; очень редко – угнетение (летаргия), мышечный тремор, атаксия и судороги. Вышеперечисленные реакции носят непродолжительный характер и самопроизвольно исчезают.

13. Беременность и период лактации.

Применение препарата не сопровождается изменениями репродуктивной способности кобелей и сук, в том числе щенных, а также у котов и кошек, в том числе сукотных; и патологий развития потомства. В рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического, тератогенного и мутагенного действия.

14. Особые указания.

Особенностей действия не выявлено.

15. Побочное действие.

При повышенной чувствительности к компонентам препарата и появлении аллергических реакций у собак и кошек, животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Препарат можно применять одновременно с противогельминтными препаратами, инсектоакарицидными ошейниками, глюкокортикостероидами, нестероидными противовоспалительными препаратами, антикоагулянтом варфарином.

17. Форма выпуска.

Препарат выпускают в картонной упаковке с 1 контурной ячейковой упаковкой из алюминиевой фольги или с многоконтурной ячейковой пластиковой упаковкой герметизированные и ламинированные подложкой из алюминиевой фольги, содержащей от 1 до 10 таблеток и инструкцию по применению.

18. Срок годности.

Срок годности препарата, при соблюдении условий хранения, составляет 30 месяцев от даты производства в невскрытой производственной упаковке. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Хранят и транспортируют препарат в защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 30 °С.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения (сроки ожидания).

Препарат не предназначен для применения продуктивным сельскохозяйственным животным.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата

Общество с ограниченной ответственностью «Ветфармстандарт»

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 125445, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОВРИНО, ул. Смольная, д. 24Д

24. Производитель ветеринарного лекарственного препарата

«Hebei Weierli Biotechnology Co., Ltd» (Хэбей Вейерли Биотех Групп Ко., Лтд)

Юридический адрес: Хайсин-роуд №5, Зона экономического развития, Округ Чжао, город Шидзяжуанг, провинция Хэбей, Китайская Народная Республика.

Адрес места производства: Хайсин-роуд №5, Зона экономического развития, Округ Чжао, город Шидзяжуанг, провинция Хэбей, Китайская Народная Республика.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «Ветфармстандарт».

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 125445, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОВРИНО, ул. Смольная, д. 24Д.